


Gonorré ökar på Gotland

- om smitta, behandling och smittspårning

Konferens om sexuell hälsa
28 november 2019

STI-statistik Gotland t o m okt 2019



Gonorré

Enligt Smittskyddslagen

- Allmänfarlig
 - besök, provtagning, behandling kostnadsfria
 - förhållningsregler måste följas
- Anmälningspliktig
- Smittspårningspliktig

Gonorré – smittvägar

Bakterie – gonokocker

(Neisseria gonorrhoeae)

- Sexuell kontakt
 - beror på sexuell praktik
urinrör, cervix, rektum, svalg
 - också via händer/fingrar
ögon
- Mor till barn vid förlossning
ögon

Gonorré – symtom

- Helt utan symtom – vanligare hos kvinnor än män
- Flytning/sveda från urinrör, slida, rektum
- Halsont – obs att gonokocker i svalget ofta inte ger symtom
- Rött öga med varig sekretion

Gonorré – komplikationer

- Äggledarinflammation – kan leda till sterilitet och extrauterin graviditet
- Bitestikelinflammation – kan leda till sterilitet
- Blodförgiftning (sepsis) – ovanligt
- Infektion i led (septisk artrit) – ovanligt

Gonorré – provtagning

Analysmetoder

- NAAT/PCR (nucleic acid amplification test /polymerase chain reaction)
 - analyserar förekomst av gonokockens DNA
 - prov sänds till lab på Karolinska sjukhuset
- Odling
 - ger möjlighet till resistensbestämning mot olika antibiotika- prov sänds till mikrobiologlab Visby lasarett
- Direktmikroskopi – färgning med metylenblått

Gonorré – provtagning

- Lokaler utifrån sexuell praktik
 - urin - NAAT
 - urinrör - NAAT, odling, mikroskopi
 - vagina/cervix - NAAT, odling, mikroskopi
 - rektum - NAAT, odling
 - svalg - NAAT, odling
- Utifrån symtom
 - sekret från öga - NAAT, odling

Gonorré - behandling

- Fråga för specialistmottagning, på Gotland Hudmottagningen på lasarettet
- Uttalad tendens till resistensutveckling mot antibiotika
- Om gonokocker i svalg, något svårare att behandla
- Standardbehandling – inj. ceftriaxon 500 mg intramuskulärt som engångsdos

Gonorré - uppföljning

- Alltid kontrollprov (NAAT) två veckor efter behandling från de lokaler där man påvisat gonokocker
- Om kvarstående symtom efter behandling kan odling tas tidigare

Smittspårning STI

- På Gotland ingen central smittspårning, alltså ingen att remittera till
- Behandlande läkare (barnmorska, sjuksköterska) har ansvar för att ta reda på kontakter minst 6 månader tillbaka, helst 12 månader
- Kontakter anges på blankett som sänds till smittskyddet

Smittspårningsblankett STI Gotland

KLAMYDIA GONORRÉ _____

NAMN _____	DAT _____ NR _____
P-NR _____ MOTT _____	SMI _____ AVSL _____
1. NUV/SENASTE PARTNER	NÄR _____
NAMN _____	FÖDD _____
ADRESS _____	
TELEFON _____	MOBIL _____
ÖVRIGT _____	

BREV NR _____	AVSÄNT _____	PÅM 1 _____	
§-Anmaning _____	REK _____	FÖRVALTNINGSRÄTTEN _____	
RESULTAT _____	DATUM _____	VAR/NÄR _____	EGET NR _____

2. NUV/SENASTE PARTNER	NÄR _____
NAMN _____	FÖDD _____

Smittspårning STI

Smittskyddet på Gotland

- uppmanar kontakten att söka vård för provtagning – i första hand brev men även via SMS m m
- kollar att prov blir lämnat
- om inget hänt efter två uppmaningar blir det ett fall för smittskyddet som myndighet: §-ärende med skarpare uppmaning

Smittspårning STI

- Om inget hänt efter upprepade anmaningar, även rekommenderat brev, kan smittskyddsläkaren gå till Förvaltningsrätten och begära beslut om tvångsundersökning med polishämtning

■ Smittspårning STI

Viktigt

- att smittspårningen går snabbt!!
- att smittspåraren är aktiv i samtalet med patienten
- med utbildning, erfarenhet och tid hos spåraren vilket ger bättre resultat