

REGISTERBLAD

Namn: Magnus Martinsson 22-2-1999

Område av riksintresse för naturvård i Gotlands län

Områdesnummer: **NRO09090**

Områdesnamn: **KÄLDÄNGET**

Kommun: Gotlands

Kartblad: 6J SV, Mittpunkt: 6J 1d 23

Area: 6 ha land

Naturgeografisk region: 14 c Gotland

Kust/havsregion: IV - Egentliga Östersjön

Regionindelning för sjöar och vattendrag:

Agrara kulturlandskapsregioner:

Landskapsform: Slätt med lägre relativ höjd än 20 m.

Riksvärde

	Äng	Flora
--	-----	-------

Värdeområde: Änge med lång kontinuitet vars struktur och biologiska innehåll ger en god bild av traditionell ängshävd. Rik flora.

Huvudkriterier:

- C. Träd- och buskbärande äng med rika vegetationstyper.
- D. Rik flora.

Stödkriterier: Kontinuitet, representativitet.

Förutsättningar för bevarande: Att ängset hävdas. Området påverkas negativt av all form av exploatering.

Säkerställande: Ingår i Länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet (objekt nummer) och i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (objekt nummer 65-7).

Käldänge är av regeringen föreslaget Natura2000-område.

Områdets huvuddrag:

Ett mycket fint, särpräglad änge. Ängset är till största delen fuktigt till blött. Skarp kontrast finns mellan nyligen kraftigt gallrad, men ännu sluten lövskog och helt öppna områden. I skogen finns dels svinrottdominerad frisk till fuktig mark. Dels finns lövkärr, tidvis med klarvattenyta och med ek och ask på höga socklar, som i ett alkärr! I svinrotängarna är lundstarr riklig. De öppna, fuktiga till våta ängarna är särpräglade och mycket värdefulla. Vegetationen är delvis mycket artrik och starkt slätterpräglad. Det

finns två huvudtyper, vilka båda är mycket särpräglade. Gräs-/lågstarrängarna är våtängar, delvis på torv, det vill säga slätterkärr. De domineras av ängsstarr och/eller hartmanstarr. Stark ställning har också klubbstarr, hirsstarr, blodtopp, åkermynta och ältranunkel. I kanterna växer rikligt med fårsvingel och loppstarr. Högörtängarna är mycket artrika. Fläckvis dominerar älgört eller smörblomma, men i stor utsträckning saknas dominerande arter. Bland annat finns i denna miljö rikligt med korskovall. Kamäxing och luddtåtel är också vanliga och kan tyda på insådd av vallfrö. I ängset finns en hel del fornlämningar som 3 husgrunder från tidig järnålder, en skärvstenshög, en lång stensträng samt ett kort stycke med två parallella stensträngar.

Referenser:

Länsstyrelsen i Gotlands län, 1993: *Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövården.*

Martinsson, M., Nordin, M., 1992: *Ängs- och hagmarker på Gotland. Del 3, Mellersta Gotland.* –Länsstyrelsen i Gotlands län.

Naturvårdsverket, 1996: *Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.* Stockholm.